

Aufgabenblatt 4

Abgabetermin: Freitag, 28. November 2003, 14:00

Erreichbare Punkte: 12

URL: <http://www.informatik.uni-trier.de/TI/Lehre/2003-2004/dsl/blatt4.ps> (blatt4.pdf)

Themen: Mengenoperationen, Mengenprodukt

Bitte besuchen Sie *regelmäßig* die Seite zur Übung und Vorlesung:

<http://www.informatik.uni-trier.de/TI/Lehre/2003-2004/DisStrukLog.html>

Dieser Seite können Informationen zur Übung, Ankündigungen der Vorlesung und/oder Übung betreffend und die Übungsblätter entnommen werden. Ich möchte darauf hinweisen, dass Abschreiben *nicht* erlaubt ist!!

Aufgabe 1:

4 Punkte

Seien A, B, C, D, S, T und M Mengen über dem Universum U . Beweisen oder widerlegen Sie die folgenden Behauptungen:

1. $((S \subseteq \overline{M} \wedge T \subseteq M) \Leftrightarrow (S \cap T = \emptyset))$
2. $(S \setminus T) \setminus M = \overline{(M \cup \overline{S})} \cap \overline{T}$
3. $(A \times (B \cup C)) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times ((B \cap D) \cup (D \cap C))$

Hinweis: Der Beweis muss anhand der Definition der Mengenoperationen geführt werden.

Aufgabe 2:

4 Punkte

Seien A und B Mengen. Beweisen Sie, dass wenn 2 Bedingungen aus den folgenden

1. $A \cap B = \emptyset$
2. $A \subseteq B$
3. $A = \emptyset$

wahr sind, dann gilt auch die 3. Bedingung.

Aufgabe 3:

4 Punkte

Geben Sie (ohne Beweis, aber mir einer kurzen Erklärung) für alle $i \in \{1, 2, 3\}$ die *kleinsten* Mengen M_i und N_i an, so dass $A_i \subseteq M_i \times N_i$ ist. (Falls M_i und N_i endlich sind, müssen die Mengen durch explizites aufzählen ihrer Elemente beschrieben werden.)

Bsp: $A_0 = \{(2, 3), (1, 2)\}$. Hier ist $M_0 = \{1, 2\}$ und $N_0 = \{2, 3\}$.

1. $A_1 = \{(a, \alpha), (4, 3), (\beta, \gamma)\}$
2. $A_2 = \{(m, n) \in \mathbb{N}_0 \times \mathbb{Z} \mid m = 2 \cdot n\}$
3. $A_3 = \{(C, D) \in P(\{2, 3\}) \times P(\{1, 3, 4\}) \mid C \cup D = \{1, 2, 3, 4\}\}$