

### Aufgabenblatt 9

Abgabetermin: Freitag, 16. Jänner 2004, 14:00

Erreichbare Punkte: 16

URL: <http://www.informatik.uni-trier.de/TI/Lehre/2003-2004/dsl/blatt9.ps> (blatt9.pdf)

Themen: Abbildungen

#### Beachten Sie auch die Rückseite des Blattes

Bitte besuchen Sie *regelmäßig* die Seite zur Übung und Vorlesung:

<http://www.informatik.uni-trier.de/TI/Lehre/2003-2004/DisStrukLog.html>

#### Aufgabe 1:

4 Punkte

Es sei die Relation  $F \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$  definiert durch

$$F := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = \sin(x)\}$$

gegeben.

Beantworten und begründen Sie folgende Fragen:

1. Ist  $f = ([-90^\circ, 362^\circ], \mathbb{R}, F)$  eine Abbildung? Wenn nein, welche Einschränkungen müssen getroffen werden?
2. Ist  $f$  eine Funktion?
3. Geben Sie das Urbild von 0 unter  $f$  an (d.h.  $f^{-1}(0)$ ).
4. Sei  $F^{-1}$  definiert durch  $F^{-1} := \{(y, x) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, y) \in F\}$  gegeben. Ist  $f^{-1} = (\mathbb{R}, \mathbb{R}, F^{-1})$  eine Abbildung? Wenn nein, welche Einschränkungen müssen getroffen werden?

#### Aufgabe 2:

4 Punkte

Seien  $M_1, M_2$  Teilmengen von  $A$ , seien  $N_1, N_2$  Teilmengen von  $B$  und sei  $f : A \rightarrow B$  eine Abbildung. Beweisen Sie, dass gilt

1.  $f(M_1 \cap M_2) \subseteq f(M_1) \cap f(M_2)$  (Geben Sie auch ein konkretes Beispiel an, welches zeigt, dass  $f(M_1 \cap M_2) = f(M_1) \cap f(M_2)$  nicht gelten kann);
2.  $f^{-1}(N_1 \cap N_2) = f^{-1}(N_1) \cap f^{-1}(N_2)$ .

#### Aufgabe 3:

4 Punkte

Seien  $f : A \rightarrow B$  und  $g : B \rightarrow C$  Abbildungen. Beweisen Sie

1. Sind  $f$  und  $g$  injektiv, so ist auch  $g \circ f$  injektiv.
2. Sind  $f$  und  $g$  surjektiv, so ist auch  $g \circ f$  surjektiv.
3. Sind  $f$  und  $g$  bijektiv, so ist auch  $g \circ f$  bijektiv.

**Aufgabe 4:**

4 Punkte

Zeigen oder widerlegen Sie bei den folgenden Relationen, dass  $f = (M, N, R)$  eine Abbildung ist.

1.  $M = N = \mathbb{R}$ ,  $xRy$  genau dann wenn  $x \cdot y = 0$
2.  $M = \emptyset$ ,  $N = \mathbb{N}_0$ ,  $R = \emptyset$
3.  $M = \mathbb{N}_0$ ,  $N = \mathbb{R}$ ,  $xRy$  genau dann wenn  $y = \log(x)$
4.  $M = \{a, b\}$ ,  $N = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ ,  $R = \{(a, \alpha), (b, \beta)\}$

Falls  $f$  eine Abbildung ist, geben Sie die Eigenschaften diese Abbildung an.